



BOLLETTINO DIFESA

ZONE: **Fondovalle**
Bassa Collina e Conoidi

Lunedì
08/06/2026

TRATTAMENTO ANTIBOTRITICO DI PRECHIUSURA GRAPPOLO

Sulle varietà a grappolo compatto come **Pinot Grigio, Pinot Bianco, Pinot Nero, Chardonnay, Traminer aromatico e Sauvignon blanc**, l'eventuale trattamento va eseguito entro la fase fenologica di prechiusura grappolo con una delle opzioni indicate in tabella.

La scelta di eseguire questo intervento, **se non effettuata la sfogliatura meccanica**, deve essere valutata in base alla varietà, il clone (compattezza del grappolo), la vigoria del vigneto e alla predisposizione della zona alle infezioni di botrite.

BOTRITE				
Principio attivo	Prodotto	Dose-hl	Dose-ha	Note
- FENEXAMID	TELDOR PLUS, ...	120 g	1,5 kg	Massimo 1 trattamento a stagione
- CYPRODINIL	MARQUIS	125 cc	1,25 l	Massimo 1 trattamento a stagione
- CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	SWITCH	80 g	0,8 kg	
- FLUDIOXONIL	GEOXE	80-100 g	1,0 kg	

La corretta e tempestiva gestione a verde del vigneto (diradamento dei germogli, sfogliatura, ...) è fondamentale per ottenere uve sane.

L'eventuale trattamento che non è da considerarsi risolutivo, va eseguito nella fascia dei grappoli curando bene la bagnatura degli stessi, pertanto prima del trattamento **è importante terminare le operazioni di sfogliatura** per garantire al prodotto di colpire i grappoli.

Nelle zone più precoci è possibile intervenire con una delle opzioni **a partire da questa settimana**.

E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D.Lgs. 81/2008).