



Bollettino di difesa provincia di Verona

Comunicato n°11
09/06/2026

Trattamento antibotritico

In questi giorni i grappoli iniziano la fase di pre-chiusura ed è il momento in cui viene posizionato l'antibotritico. Le pratiche agronomiche, soprattutto la sfogliatura meccanica, forniscono un ottimo contributo per il controllo della botrite rendendo quindi marginale il ricorso a prodotti anticrittogamici tuttavia, in caso di cloni particolarmente compatti ed in assenza di interventi defogliati meccanici, si consiglia di intervenire sulle varietà sensibili (pinot grigio, chardonnay, pinot bianco, pinot nero...). I prodotti utilizzabili sono:

prodotto		dose	note
Fenexamid	Teldor plus...	120 ml/hl (1.5 kg/ha)	Max 1 trattamento
Cyprodinil	Marquis...	150 gr/hl (1.5 kg/ha)	
Cyprodinil + Fludioxonil	Switch...	80 gr/hl (0.8 kg/ha)	Max 1 trattamento
Fludioxonil	Geoxe...	80/100 gr/hl (1 kg/ha)	Max 1 trattamento

- Una leggera sfogliatura nella zona dei grappoli migliora l'efficacia dell'intervento
- Concentrare il trattamento sulla fascia produttiva
- Trattare in assenza di precipitazioni

Flavescenza dorata

In questi giorni sono state rinvenute le prime piante con sintomi visibili di flavescenza dorata, caratterizzate da infiorescenze disseccate e accartocciamento fogliare. **Si invitano pertanto i viticoltori a prestare la massima attenzione in vigneto e di procedere con l'eliminazione immediata delle eventuali piante sintomatiche individuate.** I monitoraggi dei vigneti da parte dei nostri tecnici inizieranno la prima settimana di luglio.



