



INFORMATIVA TECNICA



Martedì
10/05/2022

POTATURA A VERDE

VIDEO TECNICO – INTERVENTI A VERDE

- Clicca sul link
https://youtu.be/CJ4rV1FTn_s
- Inquadra con la fotocamera del cellulare il QR Code



ANDAMENTO STAGIONALE

- Inizio germogliamento in ritardo rispetto allo scorso anno di circa una settimana, attualmente la situazione fenologica è in linea o in leggero ritardo rispetto al 2021.
- Lo sviluppo dei germogli prosegue in modo regolare e uniforme in tutte le zone.
- Pinot grigio, Chardonnay di fondovalle si presentano allo stadio fenologico di 3-4 foglie distese.
- Chardonnay, Pinot nero, Teroldego, Lagrein, Traminer aromatico, delle zone pedecollinari e di media collina sono allo stadio fenologico di 5-6 foglie distese.
- I vigneti delle zone di alta collina e montagna si trovano allo stadio fenologico tra il germoglio si espande e due foglie distese.

INTERVENTI A VERDE

- L'orientamento produttivo per le diverse varietà è quello previsto dal disciplinare di produzione DOC.
- L'informativa ha lo scopo quindi di fornire ai Soci alcune indicazioni relative alle operazioni a verde da effettuare nel vigneto a inizio stagione.
- Tali operazioni sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle uve alla vendemmia e devono essere eseguite con la massima attenzione e tempestività.

SPOLLONATURA

-
- Quando**
- Iniziare il lavoro quando i polloni hanno raggiunto la lunghezza di 10-15 cm e sono ancora di consistenza erbacea in modo da evitare ferite e danni.
-
- Come**
- Eliminare i polloni che crescono sul legno vecchio (fusto e branche).
-
- Obiettivo**
- Operazione importante per il contenimento delle infezioni di oidio in quanto il fungo, ad inizio stagione, si insedia preferibilmente sulle foglie basali vicino al legno vecchio.
 - Migliora l'areggiamento nella zona del calcagno, riducendo l'affastellamento della vegetazione (maggior efficacia dei trattamenti e minori tagli di potatura invernale).
-

DIRADAMENTO GERMOGLI

- Obiettivo**
- Migliorare il microclima attorno al grappolo (più aria e luce).
 - Aumentare l'efficacia dei trattamenti fitosanitari.
 - Riduzione della pressione delle malattie (oidio e peronospora).
 - **Regolazione della produzione.**
-
- Quando**
- Ad iniziare dallo stadio **vegetativo di 5-6 FOGLIE** quando i grappoli sono ben visibili.
 - In vigneti giovani e deboli la selezione dei germogli va anticipata per evitare il consumo di preziose energie da parte della vite.
 - In vigneti vigorosi è possibile posticipare l'intervento per fare in modo che la vite sfoghi l'eccesso di vigore.
 - **In tutte le situazioni, comunque, il diradamento dei germogli va ultimato prima dell'inizio della fioritura.**
-
- Come**
- Eliminare i doppi germogli.
 - Eliminare i germogli deboli.
 - Eliminare i germogli ventrali.
 - Con germogliamento disomogeneo eliminare (o spuntare) il germoglio apicale sul capo a frutto per equilibrare la crescita degli altri germogli.
-

DIRADAMENTO GERMOGLI SU GUYOT

Eliminare i germogli sul legno vecchio, lasciando solo uno o due germogli in sostituzione di uno dei due speroni se quest'ultimi non avessero germogliato; eliminare i germogli doppi dagli speroni e selezionare i germogli produttivi sul capo a frutto.

PRIMA



DOPO



DIRADAMENTO GERMOGLI SU PERGOLA

PERGOLA PRIMA



PERGOLA DOPO

