



BOLLETTINO DIFESA

ZONE: **Fondovalle**
Bassa Collina e Conoidi

Sabato
15/06/2024

TRATTAMENTO ANTIBOTRITICO DI PRECHIUSURA GRAPPOLO

Sulle varietà bianche a grappolo compatto come **Pinot Grigio, Pinot Bianco e Pinot Nero, Chardonnay, Traminer aromatico e Sauvignon blanc**

Il trattamento va eseguito entro la fase fenologica di prechiusura grappolo con una delle Opzioni (A, B, C) indicate in tabella

BOTRITE				
Principio attivo	Prodotto	Dose-hl	Dose-ha	Note
A FENEXAMID	TELDOR, TELDOR PLUS	120 g	1,5 kg	Massimo 1 trattamento a stagione
B CIPRODINIL + FLUDIOXONIL	SWITCH	80 g	0,8 kg	Massimo 1 trattamento a stagione
C FLUDIOXONIL	GEOXE	80-100 g	1,0 kg	

La corretta e tempestiva gestione a verde del vigneto (diradamento dei germogli, sfogliatura, ...) è fondamentale per ottenere uve sane e di qualità.

L'eventuale trattamento va eseguito nella fascia dei grappoli curando bene la bagnatura degli stessi, pertanto prima del trattamento è importante terminare le operazioni di sfogliatura per garantire al prodotto di colpire i grappoli.

La scelta di eseguire o meno questo intervento deve essere fatta in base alla varietà, clone (compattezza del grappolo), vigoria del vigneto e alla predisposizione della zona alle infezioni di botrite.

Ogni viticoltore dovrà quindi valutare nel proprio vigneto, in base alla sua esperienza, se e quando eseguire il trattamento antibotritico.

Nelle zone più precoci è possibile intervenire con una delle opzioni nel corso della prossima settimana.

Per le varietà a bacca bianca come Müller Thurgau e quelle a bacca rossa come Schiava, Lagrein, Merlot, Teroldego, ecc. il trattamento antibotritico verrà eventualmente consigliato all'invaiaitura con un bollettino specifico.

E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D.Lgs. 81/2008).