



# Bollettino di difesa provincia di Verona

Comunicato n°11  
03/06/2024

## Cocciniglie

Nei vigneti con presenza di cocciniglia (*Planococcus ficus*, *Partenolecanium corni*, *Pulvinaria vitis*...) si consiglia di intervenire al termine del periodo florale impiegando **MOVENTO 48SC alla dose di 1.5 lt/ha**.

Si ricorda che prima di eseguire il trattamento insetticida è necessario, **e obbligatorio**, sfalciare l'erba nel vigneto. L'operazione di sfalcio deve essere riportata anche sul registro di campagna. Si ricorda inoltre:

- Verificare che il periodo florale sia concluso
- Di trattare in assenza di vento
- Di informare del trattamento insetticida gli eventuali apicoltori della zona

## Trattamento per le Cocciniglie nei vigneti ricadenti in zone affette da virosi dell'accartocciamento fogliare

Come spiegato diffusamente negli incontri tecnici, e sulle circolari ai soci, la virosi che interessa i vigneti di alcune zone della Valdadige è trasmessa dalle cocciniglie (*Planococcus*, *Partenolecanum*...). Si invitano pertanto i soci con presenza di cocciniglia nei vigneti ricadenti nelle zone seguenti ad effettuare il trattamento insetticida con le modalità illustrate precedentemente:

- Piana di Canale
- Preabocco loc Fenilon
- Belluno v.se zona di fondovalle
- Belluno v.se collina (loc. Sabbioni)

**Per garantire un efficace difesa il trattamento insetticida va eseguito anche nelle zone dove sono stati posizionati i diffusori per la confusione sessuale (Celada vmb 180).**