



Bollettino di difesa provincia di Verona

Comunicato n°14
15/06/2024

Trattamento antibiotritico

In questi giorni i grappoli iniziano la fase di pre-chiusura ed è il classico momento in cui viene posizionato l'antibotritico. Le pratiche agronomiche, soprattutto la sfogliatura meccanica, forniscono un ottimo contributo per il controllo della botrite rendendo quindi marginale il ricorso a prodotti anticrittogamici tuttavia, in caso di cloni particolarmente compatti ed in assenza di interventi defogliati meccanici, si consiglia di intervenire sulle varietà sensibili (pinot grigio, chardonnay, pinot bianco, pinot nero...) a partire dai vigneti più precoci (e che hanno comunque raggiunto la fase di pre-chiusura grappolo).

I prodotti utilizzabili sono:

| prodotto | dose | note |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| Teldor plus | 120 ml/hl (1.5 kg/ha) | Max 1 trattamento |
| Teldor | 150 gr/hl (1.5 kg/ha) | |
| Switch | 80 gr/hl (0.8 kg/ha) | Max 1 trattamento |
| Geoxe | 80/100 gr/hl (1 kg/ha) | Max 1 trattamento |

- Una leggera sfogliatura nella zona dei grappoli migliora l'efficacia dell'intervento
- Concentrare il trattamento sulla fascia produttiva
- Trattare in assenza di precipitazioni

Flavescenza dorata

In questi giorni sono state rinvenute le prime piante con sintomi visibili di flavescenza dorata, caratterizzate da infiorescenze disseccate e accartocciamento fogliare. **Si invitano pertanto i viticoltori a prestare la massima attenzione in vigneto e di procedere con l'eliminazione immediata delle eventuali piante sintomatiche individuate.**

