Bollettino di difesa provincia di Verona

Comunicato n°8
30/05/2025

Nell'ultima settimana sono precipitati, a seconda della zona, dai 15 ai 28 mm di pioggia. La fioritura della vite è iniziata su tutte le varietà e nelle zone più precoci è ormai terminata. La crescita fogliare si mantiene sulle 2 foglie/settimana. Il meteo prevede per i prossimi giorni tempo perlopiù soleggiato con temperature in aumento.
Si consiglia di monitorare quotidianamente le previsioni meteo e comunque di trattare a circa 8 giorni dall'ultimo intervento.

principio attivo	Nome commerciale	
Folpet + Oxathiapiprolin	Zorvec Vinabria	Max 1 tratt/anno entro fine fioritura
Dithianon	Delan Pro, Delan SC, Envita…	Max 9 tratt/anno (come gruppo) – Folpet max 4 tratt/anno entro fine fioritura
Folpet	Foliane 80wg, Folpan 80wdg…	
Rame (60 gr/hl rame metallo)	Prodotti vari	Poca resistenza al dilavamento (20 mm circa)

Per la difesa dall'oidio aggiungere uno dei seguenti prodotti

principio attivo	Nome commerciale	Note
Tetraconazolo*	Domark 125, Emerald 40EW…	Max 4 tratt/anno
Penconazolo*	Scudex, Topas 200EW…	Max 4 tratt/anno (penconazolo entro fine fioritura)
Mefentrifluconazolo*	Revysion…	
Zolfo bagnabile (gr.400/500 x hl)	Prodotti vari	Zone tardive/poco soggette ad oidio

*Aggiungere gr 200/hl di zolfo bagnabile

Si ricorda che i prodotti a base di FOLPET e PENCONAZOLO si possono utilizzare per l'ultima volta (entro fine fioritura)

Cantina Sociale di Avio s.c.a. 38063 Avio (TN) via Dante 14 – tel. +39 0464 684008 – fax +39 0464 684921
www.viticoltoriinavio.it – info@viticoltoriinavio.it

Flavescenza dorata della vite

Il monitoraggio degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus* nei due vigneti di riferimento di Rivoli Veronese e Brentino Belluno indica la presenza ancora di neanidi di prima età (N1). In vigneti più caldi di pianura si registra la presenza anche di qualche neanide di seconda età (N2). Le condizioni meteo dell'ultimo periodo, caratterizzate da abbassamenti termici e precipitazioni abbondanti, hanno influito sullo sviluppo della cicalina.

Neanide di prima età (N1). Neanide di seconda età (N2).

Nel sito istituzionale dell'UO Fitosanitario al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/dettaglio-news?articleId=14226536
è stato pubblicato il DDR n. 58 dell'14 maggio 2025 "Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite nella Regione Veneto - anno 2025".
Nella medesima sezione è presente la Guida divulgativa "I Giallumi della vite in Veneto" che contiene una collezione di foto utile a riconoscere le sintomatologie tipiche dovute alla Flavescenza dorata e al Legno Nero. A breve uscirà anche il comunicato con indicazioni della finestra di esecuzione del 1° trattamento Obbligatorio.
Rispettando l'ampia forbice temporale indicata dalla regione Veneto, cercheremo di posizionare il trattamento sulla base dei dati specifici di fenologia di *Scaphoideus titanus* raccolti in Valdadige veronese.