



# Bollettino di difesa provincia di Verona

Comunicato n° 13  
18/06/2025

## Secondo trattamento obbligatorio contro *Scaphoideus titanus* (vettore della Flavescenza dorata della vite)

Nei vigneti di riferimento per lo studio della fenologia sono state osservate neanidi di seconda, terza e quarta età (L2, L3, L4), la prevalente è la terza età. Non sono presenti neanidi di prima età e questo sta ad indicare che la schiusura della uva svernanti è conclusa.

Per vedere le diverse fasi di sviluppo clicca sul link: <https://youtu.be/OvkRZeIGVka>

Il monitoraggio degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus* nei due vigneti di riferimento sono riportati in tabella:

data	Rivoli Veronese							Brentino Belluno						
	L1	L2	L3	L4	L5	A	n°	L1	L2	L3	L4	L5	A	n°
12/05/25	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	7
19/05/25	100	0	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	13
26/05/25	100	0	0	0	0	0	8	100	0	0	0	0	0	17
03/06/25	91	9	0	0	0	0	11	57	36	7	0	0	0	14
09/06/25	0	33	67	0	0	0	3	22	33	44	0	0	0	9
16/06/25	0	33	33	33	0	0	3	0	27	67	7	0	0	15



Neanide di seconda, terza e quarta età (L2, L3, L4).

Rispettando l'ampia forbice temporale indicata dalla Regione Veneto per il secondo trattamento obbligatorio, sulla base del monitoraggio locale, si suggerisce di "ottimizzare" il periodo di intervento secondo il seguente schema:

date intervento
<ul style="list-style-type: none"><li>PRIMO TRATTAMENTO - dal 11 al 16 giugno</li><li><b>SECONDO TRATTAMENTO – DAL 23 AL 28 GIUGNO</b></li></ul>

### Prodotti utilizzabili e previsti dal protocollo Trentino

Nome commerciale	Nome commerciale	Note
Etofenprox	Trebon Up, Sword Up	Consigliati nel secondo trattamento
Tau-Fluvalinate	Mavrik EW...	

Si ricorda inoltre:

- Si raccomanda di sfalciare l'erba qualora fossero ricomparse essenze in fioritura
- Il rispetto delle finestre di Intervento regionali e del numero di trattamenti da eseguire è vincolante ai fini degli obblighi di lotta contro lo *Scaphoideus titanus* come riportato nel punto 5 del decreto.
- È raccomandata la massima diligenza operativa verso tutte le disposizioni riportate nel Decreto di Lotta Obbligatoria e nell'Allegato 1 (Modalità di preparazione ed esecuzione dei trattamenti obbligatori).
- Nelle fasce di rispetto definite in etichetta dei PF è raccomandato l'impiego del silicato di alluminio (caolino calcinato) o del caolino classificato come corroborante.

## Trattamento antibiotritico

In questi giorni i grappoli iniziano la fase di pre-chiusura ed è il momento in cui viene posizionato l'antibotritico. Le pratiche agronomiche, soprattutto la sfogliatura meccanica, forniscono un ottimo contributo per il controllo della botrite rendendo quindi marginale il ricorso a prodotti anticrittogamici tuttavia, in caso di cloni particolarmente compatti ed in assenza di interventi defogliati meccanici, si consiglia di intervenire sulle varietà sensibili (pinot grigio, chardonnay, pinot bianco, pinot nero...) a partire dai vigneti più precoci (e che hanno comunque raggiunto la fase di pre-chiusura grappolo).

I prodotti utilizzabili sono:

prodotto	dose	note
Teldor plus	120 ml/hl (1.5 kg/ha)	Max 1 trattamento
Teldor	150 gr/hl (1.5 kg/ha)	
Switch	80 gr/hl (0.8 kg/ha)	Max 1 trattamento
Geoxe	80/100 gr/hl (1 kg/ha)	Max 1 trattamento

- Una leggera sfogliatura nella zona dei grappoli migliora l'efficacia dell'intervento
- Concentrare il trattamento sulla fascia produttiva
- Trattare in assenza di precipitazioni

## Flavescenza dorata

In questi giorni sono state rinvenute le prime piante con sintomi visibili di flavescenza dorata, caratterizzate da infiorescenze disseccate e accartocciamento fogliare. **Si invitano pertanto i viticoltori a prestare la massima attenzione in vigneto e di procedere con l'eliminazione immediata delle eventuali piante sintomatiche individuate.**

